

# DATOS SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER PARA NIÑOS DE ENTRE 12 Y 15 AÑOS DE EDAD



Los niños y jóvenes adolescentes ya pueden vacunarse contra el COVID-19. Por el momento, la única vacuna autorizada para menores de 18 años es la de Pfizer-BioNTech. Al igual que las vacunas contra el sarampión, las paperas y otras enfermedades, la vacuna contra el COVID-19 protege a tu hijo de esta enfermedad (causada por el coronavirus), que puede prevenirse. Los niños no son inmunes al COVID-19. En total, se han informado 1.5 millones de casos en niños de entre 11 y 17 años de edad en los EE. UU. La vacuna contra el COVID-19 es su mejor protección frente a esta enfermedad. La vacunación también les da a los niños la posibilidad de volver a las clases presenciales, lo cual contribuye al bienestar de todos ellos. **A continuación, se incluyen algunos datos importantes que los padres deberían saber:**

## LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ES SEGURA PARA LOS NIÑOS

- Un ensayo clínico en el que participaron más de 2,000 niños y jóvenes adolescentes (de 12 a 15 años de edad) demostró que la vacuna es 100 % eficaz y tiene una buena tolerancia. **No se detectaron casos de COVID-19 entre los niños que se vacunaron.**
- Es de particular importancia vacunar a los niños que padecen problemas de salud subyacentes, así como a los que viven con otras personas (tanto jóvenes como adultos) que padecen alguna afección médica.
- No se ha informado pérdida de fertilidad entre los millones de personas que ya se han aplicado las vacunas aprobadas para un uso de emergencia, y no hay evidencia de que puedan ocasionarla.
- Las vacunas contra el COVID-19 ahora puede aplicarse junto con otras vacunas pediátricas. Procura vacunar a tu hijo cuando tenga la próxima visita de control.



## SE INFORMARON EFECTOS SECUNDARIOS MÍNIMOS

- Los niños que participaron en el ensayo clínico produjeron una fuerte respuesta inmunológica y no desarrollaron ningún efecto secundario grave.
- Los efectos secundarios más comunes, similares a los de los adultos, fueron fiebre, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, o dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección.
- **Por lo general, los efectos secundarios duraron entre uno y tres días, y fueron más comunes después de la segunda dosis.**



## SE RECOMIENDA APLICAR LAS DOS DOSIS DE LA VACUNA CON UNA DIFERENCIA DE TRES SEMANAS ENTRE SÍ



## LA VACUNACIÓN ES GRATUITA EN TODO EL ESTADO

- Tu hijo puede aplicarse la vacuna de Pfizer a través de pediatras, farmacias, clínicas de la División de Salud Pública (DPH) y algunos hospitales y centros de salud aprobados por el gobierno federal (FQHC).
- Visita [de.gov/youthvaccine](https://www.de.gov/youthvaccine) para obtener más información. Todas las clínicas de la DPH vacunan sin cita previa.



## SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN



Respetar el distanciamiento social manteniendo una distancia mínima de 3 pies.



Cúbrete la nariz y la boca con una mascarilla o un cubreboca, y no compartas esta protección con otros.



Lávate o desinfecta las manos con frecuencia.